

PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII

- Aby prawidłowo przygotować się do badania kolonoskopowego niezbędne są substancje umożliwiające oczyszczenie jelit np. FORTRANS (4saszetki), zapytaj w rejestracji.
- Osoby przyjmujące leki wpływające na krzepliwość krwi, np. Acard, Polocard, Acenocumarol, Sintrom, Tilcis, Plavix, Aspiryna, Acesan u których planowane jest usuwanie polipów, powinny przerwać ich stosowanie na 5-7 dni przed zabiegiem; należy jednak wcześniej **KONIECZNIE** skonsultować się z lekarzem prowadzącym. Konieczna może być zamiana tych leków na heparynę niskocząsteczkową (np. na Clexane lub Fraxiparynę)
- 6 dni przed planowanym badaniem nie należy spożywać sałatek jarzynowych, owoców pestkowych (np. winogron, kiwi, truskawek, malin, jeżyn, jagód, pomidorów), maku oraz pestek siemienia lnianego, pieczywa z całymi ziarnami zbóż- mogą one wpływać na jakość badania. Uniemożliwiają całościową ocenę ściany jelit z trakcie badania.
- W dzień poprzedzający badanie rano proszę zjeść lekkie śniadanie.

Na obiad zalecamy około godz. 13:00 zupełny głód. Około godziny 14:00 przygotować roztwór rozpuszczając każdą z 4 saszetek preparatu w 1 litrze wody /mineralnej niegazowanej lub przegotowanej i ostudzonej.

- Przygotowany roztwór należy wypić w przeciągu 4-6 godzin w tempie 1 szklanka co 15-20 minut. Od chwili rozpoczęcia przygotowania Fortransem nie należy już nic jeść. Można pić płyny klarowne, niegazowane do 4 godzin przed badaniem lub zabiegiem. Normalną reakcją w czasie przygotowania są liczne wypróżnienia, pod koniec treścią płynną.
- Osoby z chorobami wymagającymi stałego przyjmowania leków (np. nadciśnienie tętnicze, choroba serca, padaczka) powinny zażyć poranną dawkę leku popijając wodą.
- Osoby chorujące na **CUKRZYCĘ** powinny dodatkowo skonsultować z lekarzem prowadzącym sposób przygotowania do badania oraz poinformować rejestrację naszego ośrodka.
- Osoby wymagające okularów do czytania proszone są o zabranie ich ze sobą.

UWAGA!

W dniu badania lub zabiegu endoskopowego wykonywanego w warunkach ambulatoryjnych, w znieczuleniu dożylnym **NIE WOLNO** prowadzić pojazdów mechanicznych oraz **KONIECZNA** jest obecność drugiej osoby.

W PRZYPADKU BRAKU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ BĄDŹ BRAKU WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH LEKARZ MOŻE ZDECYDOWAĆ O NIEWYKONANIU ZNIECZULENIA.

(morfologia krwi obwodowej, czasy krzepnięcia- APTT, INR, elektrolity- poziom sodu, potasu, kreatynina, poziom glikemii, TSH)

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny.